Avispas Chaqueta Amarilla | Preparación para el Tratamiento

SILVER BULLET PEST CONTROL | 973-510-2585 | newjerseypestcontrolservices.com

ANTES DE LA VISITA

☐ Mantenga a niños, mascotas y otras personas lejos del nido y de la ruta de vuelo. No golpee, rocíe, tape ni bloquee la entrada de un nido activo.

☐ Identifique el punto de entrada en la pared exterior, revestimiento, alero u otra abertura. Avise al técnico si escucha zumbidos en la pared o ha visto avispas dentro.

☐ Cierre las puertas y ventanas cercanas. Deje libre el acceso al área, retirando objetos solamente si puede hacerlo con seguridad.

IMPORTANTE: NIDOS EN PAREDES Y APARICIÓN DENTRO DE LA CASA

☐ Cuando el nido está dentro de una pared exterior, algunas avispas pueden aparecer en el interior durante o después del tratamiento al buscar otras salidas.

☐ Revise posibles rendijas interiores cerca de la pared afectada, como marcos de ventanas, zócalos y pasos de tuberías. Informe al técnico para recibir indicaciones sobre cómo sellarlas de manera segura.

☐ NO selle la entrada EXTERIOR activa hasta confirmar que la colonia está inactiva. Esto puede dirigir las avispas hacia el interior. No abra la pared ni intente sellar huecos mientras estén saliendo avispas.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

☐ Siga las instrucciones del técnico sobre distancia de seguridad y restricciones de reingreso según la etiqueta del producto.

☐ No moleste el nido. Puede haber actividad temporal. Informe si la actividad continúa o aumenta, especialmente dentro de la casa.

☐ Si aparecen avispas adentro, aísle la habitación si es seguro, mantenga alejadas a las personas y mascotas, y llame a Silver Bullet.

SEGURIDAD DE EMERGENCIA

☐ Si una picadura causa dificultad para respirar, hinchazón de garganta, desmayo u otros síntomas de reacción alérgica grave, llame al 911.

Follow all technician instructions and pesticide label requirements. / Siga las instrucciones del técnico y de la etiqueta del producto.